

M.5848.2

85
04
2015

M5848-2 1. 2848.

Handwritten signature or name

ИЗДАНИЕ КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ.


ЗАРАЗНЫЯ БОЛѢЗНИ

ИХЪ ПРИЗНАКИ.
УХОДЪ ЗА БОЛЬНЫМИ.
СРЕДСТВА УБЕРЕЧЬСЯ ОТЪ ЗАРАЗЫ.



РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРОСТАГО НАРОДА,
СОСТАВЛЕННОЕ ВРАЧЕМЪ
В. В. РУДИНЫМЪ

И ОДОБРЕННОЕ КОСТРОМСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ ЗЕМСКИМЪ СЪБРАНИЕМЪ
ПО ПОСТАНОВЛЕНІЮ 10 ДЕКАБРА 1892 ГОДА.



КОСТРОМА.

Типо-литографія Ф. А. Фалькъ.
1892.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стран.
Оспа - -	- 4
Корь - -	- 8
Коклюшъ - -	- —
Дифтеритъ - -	- 9
Скарлатина - -	- 10
Горячки - -	- 11
Кровяной поносъ - -	- 14
Холера - -	- 15
Дѣтскій лѣтній поносъ - -	- —
Рожа - -	- 16
Сифилисѣ - -	- 18
Чахотка - -	- 21
Сибирская язва - -	- —
Санъ - -	- 23

ЗАРАЗНЫЯ БОЛѢЗНИ

ОСПА.	Ихъ признаки.	КОКЛЮШЪ.
КОРЬ.	Уходъ за больными.	ЧАХОТКА
СКАРЛАТИНА.	Средства уберечься	ХОЛЕРА.
ГОРЯЧКИ	отъ заразы.	КРОВЯНОЙ ПОНОСЪ.
ДИФТЕРИТЬ.		ДѢТСКІЙ ЛѢТНІЙ
РОЖА.		ПОНОСЪ
СИФИЛИСЪ.		САПЪ.
		СИБИРСКАЯ ЯЗВА.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРОСТАГО НАРОДА,

Составленное врачомъ В. В. РУДИНЫМЪ

И ОДОБРЕННОЕ КОСТРОМСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ ЗЕМСКИМЪ СОВѢЩАНІЕМЪ
ПО ПОСТАНОВЛЕНІЮ 10 ДЕКАБРЯ 1891 ГОДА.

КОСТРОМА.

Типо-литографія Ф. А. Фалькъ.

1892.

616.9

8281



ОБЕРЕЖЕНО
1946 г.

Печатано съ разрѣшенія Медицинскаго Совета Министерства Внутреннихъ Дѣлъ
23 Апрѣля 1892 года.

Вѣкъ живучи, не мало приходится переиспытать
горя. Самое большое горе болѣзнь и увѣчье.

Болѣзней у человека не одна сотня. Изъ нихъ
однѣ **ПРИЛИПЧИВЫ**, наиримѣрь: горючка, оспа (лопуха),
сибирская язва; другія **НЕ ПРИЛИПЧИВЫ** — ожога, угарь,
переломъ кости и проч.

Прилипчивыя болѣзни опасны тѣмъ, что отъ одно-
го человека въ короткое время можетъ заболѣть цѣлая
семья, а отъ семьи — цѣлая деревня. При этомъ сразу
остается много сиротъ, безпомощныхъ стариковъ и
увѣчныхъ. Тяжело имъ всѣмъ живется, да не легче и
тѣмъ, на чьихъ рукахъ они остаются.

Не трудно уберечься отъ огня, когда знаешь, какъ
съ нимъ обращаться. Легче будетъ избавиться отъ при-
липчивой болѣзни, если съумѣешь ее по времени узнать
и тебѣ извѣстно, отчего она бываетъ; меньше искаже-
нется и умретъ народу, если будутъ знать, чѣмъ вред-
на прилипчивая болѣзнь и какъ слѣдуетъ обращаться
съ больнымъ.

По этому полезно и пора знать всякому: какія
бываютъ прилипчивыя болѣзни, отчего онѣ бываютъ,
какъ отъ нихъ уберечься и какъ ухаживать за боль-
ными, чтобы онѣ легче перенесъ болѣзнь.

Признаки. 1. **О С П А** (лопуха) начинается у взрослых знобомъ, у дѣтей рвотой ¹⁾ (блюеть). Потомъ разжигаетъ. Сильно неможется болить спина. На 3-й день ворту и зевѣ (въ горлаѣ) красные прыщи. ²⁾ На 4-й день прыщи по лицу и головѣ, на 5-й—по всему тѣлу; жаръ меньше, больному полегче; съ 6-го по 9-й день прыщи бѣлѣютъ, наливаются сукровицей, становятся въ горошину, въ серединѣ прыща дѣлается ямка; на 9-й день—желтѣютъ, наливаются гноемъ; опять слово разжигаетъ и неможется. Иной разъ гнойные прыщи сливаются подъ одну корку—больному еще труднѣе, онъ можетъ умереть. На 12-й день прыщи темнѣютъ, гной засыхаетъ, образуются бурья коросты; жаръ проходитъ. На 21-й день коросты сваливаются, больной поправляется. Часто сыпь бросается въ глаза, отъ этого можно окривѣть и ослѣпнуть. Не рѣдко она бываетъ въ дыхательномъ горлаѣ, въ переднемъ и заднемъ проходѣ—тогда больно мочиться и испражняться (до вѣтру).

Отчего бы- Оспа очень заразительна (прилипчива). Зараза въ ваетъ оспа, гною прыщей. Гной можетъ высохнуть, раскрошиться и обратиться въ мелкую, невидимую пыль; пыль разлетается; здоровые незаметно ее вдыхаютъ и заражаются оспой; они могутъ заразиться и тогда, когда оспенный гной попадетъ въ трещину или ранку.

Начало Первые признаки оспы обнаруживаются 12—15 оспы. дней спустя послѣ заражения; все это время называются скрытымъ началомъ болѣзни.

1. При всѣхъ болѣзняхъ у маленькихъ дѣтей мѣсто оспы бываетъ рвота.
2. Прыщи эти содрывать и лопать раньше чѣмъ на кожѣ, потому ихъ можно проглядѣть.

Предосто- Самое вѣрное средство—въ дѣтствѣ еще до про- рожности рѣзыванія зубовъ привить предохранительную оспу. ¹⁾ отъ заразы Если же она не привита, то:

1. Держаться поодаль отъ человѣка, который хоть съ минутой побылъ около больного—въ продолженіе **СКРЫТАГО НАЧАЛА** (при оспѣ 15 дней) нельзя поручиться, что онъ не заболѣетъ и не заразитъ другихъ, нельзя такъ же поручиться, что на его одежду и другія вещи не понало заразительной пыли съ больного.

2. Если въ домѣ завелся такой больной, то слѣдуетъ немедленно (при первыхъ признакахъ) отправить его въ больницу или другимъ способомъ совершенно отдѣлать отъ здоровыхъ. А если этого сдѣлать нельзя, то:

3. Постороннихъ въ домѣ не пускать (заразятся и разнесутъ заразу).

4. Стараться, чтобы оспенный гной не попадалъ на здоровыхъ. Не допускать, чтобы оспенные прыщи сильно высыхали, крошились и превращались въ пыль. Для этого нужно:

5. Всего (даже волосы ²⁾) больного обтирать по чище (разъ 20 въ сутки) мыльной водой. ³⁾

6. Не допускать, чтобы больной плевалъ, харкалъ и сморкался куда попало—подставлять ему для этого глиняное муравленое блюдо или таковую-же черепню съ мыльной водой.

1) Самая лучшая предохранительная оспа съ тѣлать; объ ней, я думаю, всѣмъ знаетъ.

2) Волосы нужно на гладко остричь—легче головѣ, да и удобнѣе соблюдать чистоту.

3) О томъ, какъ ее приготовить, смотри въ концѣ (приложеніе).

7. Заплеванные, захарканныя, засморканныя и запачканныя мѣста (полъ, лавки, стѣны и проч.) смазывать немедленно (если некогда вымыть) горячимъ льнянымъ масломъ (хорошо провареннымъ), дегтемъ, смолой — что есть подъ рукой.

8. Кормить и поить больного изъ особой посуды, особой ложкой.

9. Не допускать мочиться и испражняться подъ себя и куда попало — подставлять глиняную муравленую плочку или черепню съ мыльной водой.

10. Заплеванныя, захарканныя, засморканныя, пропитанныя мочей и замаранныя наломъ вещи немедленно вынести ¹⁾ въ сырое мѣсто подалеже отъ дому и положить въ карчагу съ мыльной водой ²⁾ — пусть мокаетъ до стирки, а что выстирать нельзя (шубы, одѣяла, подушки, перины и прочее такое), то слѣдуетъ хорошенько выжарить въ печи и выколотить на улицѣ. Старье лучше просто сжечь.

11. Передъ стиркой обношенные вещи хорошенько прокипятить въ той-же водѣ и въ той-же карчагѣ, въ которой мокли; къ водѣ прибавить по больше соли.

12. Когда болѣзнь окончилась и больной достаточно окрепъ, вымыть его не въ жаркой печкѣ. Мыть хорошенько всего въ нѣсколькихъ водахъ съ мыломъ.

13. Покойника не обмывать, а вынести въ прохладное мѣсто.

14. Послѣ больного или покойника полъ, лавки, столъ, стѣны и другія замаранные вещи опарить кипяткомъ щелокомъ, выскоблить и хорошенько вымыть.

1) Всѣ эти вещи нужно выносить въ мокрое мѣсто и не прижимать къ себѣ, а держать подале.

2) Чтобы вода покрывала.

15. Весь домъ проветрить сильнымъ сквознымъ вѣтромъ, а съ тряпьемъ и одеждой распорядиться, какъ сказано въ 10-мъ правилѣ.

16. Около дому не лить помой, не кидать тряпье, черепки и всякій домашній хламъ — все это унести какъ можно дальше отъ жилища и, что можно, сразу сжигать.

17. (*) Воду, которой обмываютъ больного и себѣ не разбрызгивать, а осторожно выливать подалеже отъ жилища, а посудину, ⁽¹⁾ надъ которой обмывали хорошенько ополаскивать и почаще смазывать дегтемъ.

Уходъ за больнымъ. 1. Кормить кипяченымъ молокомъ по немногу, 2 ложки разъ 10—12 въ сутки. Послѣ молока нѣсколько глотковъ отварной воды или жидкаго чаю.

Если нѣсколько дней не было до вѣтру и брюхо тугое дать проносное ⁽²⁾.

Какъ можно чаще промывать холодной водой глаза а на вѣки класть чистыя мокрыя самыя холодныя тряпочки.

Недѣвать расчесывать оспенныя коросты.

(*) ПРИМѢЧАНІЕ: нѣкоторые изъ этихъ 17 правилъ пригодны и для другихъ болѣзней на нихъ и я буду указывать въ своемъ мѣстѣ.

(1) Деревянная негодится; лучше всего глиняная таза или большая черепня — но жалко потому и разбить.

(2) О томъ какое проносное и какъ давать сказано въ концѣ (смотри приложение).

Продолжи- 2. **КОРЬ** обнаруживается 10 дней спустя
тельность. **послѣ зараженія.**
скрытаго
начала.

Признаки. Сначала въ перемешку познабливаетъ и разжигаетъ;
болѣзни. **вскорѣ краснѣютъ и слезятся глаза, боится
свѣту; насморкъ и кашель.** Такъ три дня. **На 4-й
день** показываются красныя пятна на лицѣ; весь
5-й, 6-й, а иногда и 7-й день сыпь эта умножается
и распространяется по тѣлу. Величина пятенъ
отъ коноплянаго сѣмени до боба. Все время разжигаетъ.
Съ 7-го или 8-го дня сыпь и жаръ быстро про-
падаютъ, кожа мелко шелушится; больному ста-
новится легче. Шелушеніе кожи продолжается недѣлю
и наступаютъ выздоровленіе. Отъ кори умираютъ рѣдко.

Коревая. **Коревая зараза въ слѣзахъ, носовой мок-**
зараза. **ротѣ (сопляхъ) и харкотинѣ больного.** Правила
предосторожности при кори тѣ-же, что и при оспѣ,
а въ особенности строго нужно соблюдать 5-е,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 и 15-е.

Уходъ за. Уходъ такой-же, какъ при оспѣ; кромѣ того
большимъ. **нужно беречь больного отъ простуды, а глаза
его отъ яркаго свѣта.**

Скрытое. 3. **КОКЛЮШЪ** обнаруживается 7 дней спустя по-
начало. **слѣ зараженія.**

Признаки. **Начинается простымъ кашлемъ; 2-4 недѣли
спустя кашель становится очень сильнымъ; при-
ступы кашли отъ 25 до 100 разъ въ сутки;
во время приступа кашель очень частъ: больной едва
успѣваетъ перевести духъ, чтобы прокашляться;
лицо багровѣетъ, надувается, изъ глазъ слезы— не-
зависимо можно подумать, что захлѣбнулся или подавился.
Часто при этомъ рвота (блюетъ). Отъ такого кашля ве-
рѣдко на бѣлкахъ глазъ выступаютъ ярко баг-**

**ровыя красныя пятна, какъ отъ ушиба, показы-
вается иногда кровь изъ носу. Ни днемъ ни ночью нѣтъ
покою, пища то и дѣло выходитъ обратно со рвотой;
больной слабѣетъ и можетъ умереть, но это бываетъ
рѣдко. Волчанъ можетъ затянуться на нѣсколько мѣ-
сяцевъ, но чаще оканчивается въ 6 недѣль. Бо-
лѣютъ преимущественно дѣти.**

Уходъ. **Самое главное чистый воздухъ— чтобы въ
комнатѣ не было ни пыли ни вони. Въ тихую, сухую
погоду больному полезно прохаживаться по улицѣ.
Беречь отъ простуды.**

Предосто- **Коклюшная зараза въ харкотинѣ.** По этому
рожности. **нужно соблюдать особенно строго 6, 7, 8 и 10
правила.**

Скрытое. 4. **ДИФТЕРИТЪ** обнаруживается 2-7 дней спу-
начало. **сти послѣ зараженія.**

Признаки. **Дѣлается больно глотать и развѣвать ротъ;
болѣзни. подъ ушами нижней челюсти (подъ скулами или салаз-
ками) въ это время можно прощупать болочіе
желвачки подъ кожей. Разжигаетъ. Въ глоткѣ
около маленькаго язычка, а иногда и на немъ
и позади его сильная краснота и мѣстами разной
величины бѣловатыя пятна (цвѣтъ ихъ ударяетъ
то въ желтый, какъ старая салъная свѣча, то въ сѣ-
рый, какъ овсяный кисель). Рѣчь невнятная, гло-
токъ не проходитъ и часто черезъ носъ выливается
обратно. Занятнанныя мѣста въ «глоткѣ» начи-
наютъ гнить— сильно воняетъ мертвечиной; (1
слиюна и сопли при этомъ часто бѣды и похожи на сук-
ровицу. Больной очень слабъ; ему трудно ды-
шать. Иной разъ гниль отстаетъ, выплевывается, вы-**

1) Оттого дифтеритъ часто называютъ гнилой жабой.

смаркивается и больной понемногу выздоравливает. Часто однако слабость и удушье увеличивается — больной умирает. Хворают больше дѣти.

Предосторожности. Зараза дифтеритная въ слюнѣ и носовой слизи (сопляхъ). По этому особенно строго слѣдуетъ заразы. **Уходъ за больнымъ.** Пища только жидкая — теплое молоко, яйца въ сметку; послѣ пищи каждый разъ прополаскивать ротъ, горло и носъ теплымъ борнымъ полоскавьемъ; ¹⁾ этимъ-же полоскавьемъ и сверхъ того полоскать въ горлѣ почаще только не глотать его, по этому маленькимъ дѣтямъ вмѣсто него давать нѣсколько глотковъ теплой кипяченой воды. Пить почаще хорошимъ крепкимъ чаемъ съ краснымъ церковнымъ виномъ (а если нѣтъ — съ простымъ; чайную ложку на чашку). Заставлять 4—6 разъ въ сутки дышать розина ротъ надъ горшечкомъ съ шипиткомъ и скипидаромъ. ²⁾

Скрытое начало. **5. СКАРЛАТИНА** обнаруживается 4—7 дней спустя послѣ зараженія.

Признаки. Сильный анось, жаръ, больно глотать, подъ нижней челюстью (подъ скулой) болючіе подкожные желвачки. Спустя сутки, много—двой на шеѣ, спинѣ, груди, рукахъ и ногахъ высыпаютъ темно-красныя частыя крапинки на ярко красномъ полѣ. Языкъ сухъ, красенъ и шереховатъ — похожъ на кошачій; въ зѣвѣ (на маленькомъ язычкѣ и по бокамъ) тоже яркая краснота и такія-же гнилыя пятна какъ при дифтеритѣ. Жаръ усиливается до крайности; глотать очень трудно — глотокъ попадаетъ въ носъ; рѣчь не внятная; сильно неможется. Къ 10-му

1) Объ этомъ полоскавьи смотри въ концѣ (приложенію).

2) Объ этомъ смотри въ концѣ (приложенію).

дню отъ начала первыхъ признаковъ жаръ постепенно убываетъ и все остальное проходитъ; кожа начинаетъ луниться крупными лепестками; больной чувствуетъ себя хорошо и на 5-й недѣль окончательно выздоравливаетъ. Однако не всегда бываетъ благополучно — часто въ горлѣ, на шеѣ, даже въ ушахъ бывають нарывы; верѣдко, особенно если больной рано ставетъ выходить на улицу и простудится бываетъ водяная отъ воспаления почекъ. Отъ нарывовъ и отъ водяной часто умирають. Хворають больше дѣти.

Предосторожности. Зараза въ сопляхъ, слюнѣ, харкотиніи и въ кожной шелухѣ (лепестья и перхоть), по этому особенно строго нужно соблюдать 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 17-е правила.

Уходъ. Давать по нѣсколько глотковъ теплаго кипяченнаго молока нѣсколько разъ въ день, запивать чаемъ или кипяченой водой, чтобы во рту и глоткѣ было чисто. Заставлять полоскать борнымъ полоскавьемъ и дышать парами со скипидаромъ такъ-же какъ при дифтеритѣ. Пока лунится кожа не выпускать въ сани и на улицу, беречь отъ простуды и послѣ этого. При водяной сажать каждодневно на 1/2 часа по плечи въ воду немного потеплѣе парнаго молока; послѣ этого тотчасъ больного обтереть, обернуть шерстянымъ платкомъ или чѣмъ сухоннымъ и уложить въ постель. Если запоръ и брюхо тугое — немедленно давать проносное.

Т И Ф Ы (Горячки). Ихъ три: брюшной, пятнистый и возвратный.

Скрытое начало. **6. БРЮШНОЙ ТИФЪ** обнаруживается 14—21 днѣ спустя послѣ зараженія.

Признаки. Сначала нѣсколько разъ познаблываетъ; день ото болѣани. дня прибываетъ жаръ. Сильно неможется и болить

голова. Ниже и вправо от пупка животъ вздутъ, если тутъ надавить, больно; запоръ; такъ продолжается съ недѣлю. На 2-й недѣлѣ жаръ самый сильный, больной въ забытьѣ, то сильно бредитъ, всмакиваетъ съ постели и старается иной разъ убѣжать; во рту сухо; на деснахъ и языкѣ отъ этого бурная кора; рѣчь невнятная какъ у пьянаго; поносъ; ⁽¹⁾ кало жидкое желтоватое похоже на жижу изъ варенаго гороха. Въ концѣ этой недѣли на брюхѣ показывается мало заметная блѣдно-красная сыпь. На 3-й и 4-й недѣлѣ жаръ и поносъ исподволь уменьшаются, больной приходитъ въ себя, очень слабъ, долго поправляется. Смерть бываетъ чаще въ концѣ 2-й и на 3-й недѣлѣ отъ продолжительнаго жару и взнеможенія.

Предосторожности отъ заразы. Зараза въ калѣ больного, по этому строго соблюдать 9, 10, 11, 14, 15, 16 и 17 правила.

Уходъ. Болѣзнь продолжительна и сильно изнуряетъ, по этому стараться пищей и питьемъ поддерживать силы больного. Питье давать чаще кипяченую воду, чай, если руки и ноги холодныя — теплый чай съ виномъ церковнымъ или съ простымъ. Кормить до конца 4-й недѣли ⁽²⁾ только жидкой пищей: кипяченымъ молокомъ, яичами въ сметану, овсяной кашней мясной. Оправлять чаще постелью, чтобы не было шишекъ, бугровъ, складокъ и чаще переворачивать больного — иначе будутъ пролежни. Пока жаръ великъ обтирать все тѣло до коленъ и локтей разъ 20 въ сутки самой холодной водой.

⁽¹⁾ Поносъ бываетъ оттого, что въ кишкахъ дѣлается язва.

⁽²⁾ Пока язва въ кишкахъ не зажила.

Скрытое начало. 7. ПЯТНИСТЫЙ или СЫПНОЙ ТИФЪ обнаруживается 7—14—21 день спустя послѣ зараженія.

Признаки болѣзни. Знобъ. Вскорѣ сильный жаръ сильно голова болитъ. На 5-й—6-й день красневшая сыпь сначала по краю реберъ потомъ на всемъ туловищѣ, рукахъ и ногахъ. Пятна не крупныя. Въ то—же время больной или сонливъ, или безпокоимъ, не узнаетъ своихъ, бредитъ. На деснахъ, зубахъ и языкѣ бурная кора. Сильная жажда. Кожа сухая, горячая. Иногда ноги и руки холодныя — это признакъ дурной — того и гряди смерть. Въ концѣ 2-й недѣли вдругъ сильный потъ и покойный сонъ. Черезъ нѣсколько часовъ больной приходитъ въ чувство и быстро поправляется.

Предосторожности отъ заразы. Особенно строго соблюдать 2, 3, 5, 10, 11, 13 и 15 правила.

Уходъ. Чаще пить холоднымъ клюквеннымъ морсомъ или отварной холодной водой; за разъ 2—3 глотка, не больше. Волосы остричь. То и дѣло (въ сутки разъ 20 и больше) мочить голову и обтирать тѣло до локтей и коленъ самой холодной мыльной водой.

Если руки и ноги холодныя, то обтиранье продолжать по прежнему, а питье давать теплое — чай съ виномъ, какъ при дифтеритѣ. Чаще больного переворачивать, чтобы не належаа пролежней.

Скрытое начало. 8. ВОЗВРАТНЫЙ ТИФЪ обнаруживается спустя 5—7 дней послѣ зараженія.

Знобить, трисеть какъ въ лихорадкѣ; послѣ этого больной какъ въ огнѣ. Всего ломить, а особенно спину и ноги. Не рѣдко бѣлки глазъ и кожа желтѣютъ. Щупать въ подреберьяхъ больно. Безсонница. Такъ проходитъ 6, 7 дней. На 7 или 8 день вдругъ пролив-

ной потъ и черезъ нѣсколько часовъ жаръ пропадаетъ. Больной быстро поправляется; проходитъ еще недѣля и болѣзнь можетъ повториться снова. Иной разъ такъ бываетъ до 5 разъ. Умирають рѣдко.

Предосторожности и уходъ тѣ-же, что при пятно-рожности и истой горячкѣ.

Уходъ.

Скрытое начало. **9. КРОВЯНОЙ ПОНОСЪ** обнаруживается спустя 8 дней послѣ зараженія.

Признаки. Начинается простымъ поносомъ. Вскорѣ позывы испражняться (до вѣтру) ствоятся очень часты — у иного 30 разъ въ сутки, даже 60, 100. Передъ каждымъ испражненіемъ ворчитъ въ животѣ и колетъ. Испражненіе бываетъ натужное, въ заднемъ проходѣ сильная боль, отъ боли кидаетъ въ ноги, ноги и руки холодѣютъ. Послѣ испражненія позывъ остается кажетъ, что еще не все вышло. вмѣсто кала за каждый разъ выходитъ съ ложку слизи (въ родѣ соплей); потомъ къ слизи примѣшиваются капельки и жилочки крови; послѣ этого вся слизь дѣлается кровянистой; наконецъ вмѣсто крови въ слизи примѣшивается много гною. Больной не ѣсть не спитъ, мучится отъ боли, слабѣетъ и не рѣдко умираетъ. Иногда испражненія дѣлаются бурыми, ѣдкими, вонючими какъ падалъ — признакъ плохой: смерть близка. Болѣзнь тянется 4 недѣли и больше.

Предосторожности отъ заразы. Зараза въ испражненіяхъ больного, по этому нужно какъ можно строже соблюдать 9, 10, 11, 14, 16, и 17 правила.

Уходъ. Кормить только жидкимъ и понемногу — нѣсколько глотковъ. Въ пищу кипяченое молоко, овсяная кашка, въ сметку яйцо. Пить чаемъ съ краснымъ церков-

нымъ виномъ. На животъ припарку изъ льняного сѣмени или овса. Пока со слизью выходятъ комочки настоящего кала, давать каждое утро ложку настоя роваго масла.

Скрытое начало. **10. ХОЛЕРА** обнаруживается черезъ 2—3 дня послѣ зараженія.

Признаки. Начинается простымъ поносомъ — сразу выходитъ много жидкаго кала. Въ сутки можетъ пронести 10 разъ и больше. Если болѣзнь усиливается, то вмѣсто кала идетъ почти что одна вода; поднимается рвота (блюетъ) сперва пищей и желчью, а потомъ водянистая. мочи мало или нѣтъ вовсе; сильная жажда; больной чувствуетъ жаръ внутри, а губы, носъ, руки и ноги холодныя, морщинистыя; лицо осунувшись, глаза ввалились; мучительныя судороги въ икрахъ лѣжкахъ и пальцахъ; тоска. Когда дѣло дошло до водянистаго поноса и рвоты, а мочи не показывается — надежды на поправку мало. Смерть можетъ наступить на первыя же сутки.

Предосторожности отъ заразы. Зараза въ испражненіяхъ и рвотѣ, по этому поступать съ ними какъ сказано въ 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 и 17 правилахъ. Человѣка, у котораго въ холерное время открылся простой поносъ, считать подозрительнымъ и обращаться съ нимъ и его испражненіями какъ сказано въ 1, 8, 9, 10 и 11 правилахъ.

Признаки. **11. ДѢТСКІЙ ЛѢТНІЙ ПОНОСЪ** бываетъ у грудныхъ дѣтей; во время жары ихъ захварываетъ въ короткое время очень много; умирають въ теченіе лѣта сотни и тысячи такихъ дѣтей.

Начинается простымъ поносомъ и рвотой; пронести по многу въ сутки разъ 8 и больше; кало мѣ-

стами желтое, мѣстами зеленое; въ немъ замѣтные бѣлые комочки свернутого и неперевареннаго молока; рвота не свернутымъ молокомъ вскорѣ послѣ пиши. Потомъ кало и рвота дѣлаются какъ при холерѣ водянистыми, безъ запаха; ребенокъ марается до 40 разъ въ сутки; моча не выкалывается. Глаза воспаляются, губы свѣбуютъ, носъ, руки и ноги холодныя. Смерть близка. Передъ смертью часто рвота перестаетъ, дѣлается икота и иногда судороги всего тѣла.

Причины болѣзни. Чаще болѣютъ грудныя дѣти, которыхъ кормятъ коровинымъ молокомъ, жвачкой, кашей и чѣмъ попало; рѣдко случается болѣзнь у тѣхъ, которые сосутъ только молоко матери.

Уходъ. Кромѣ груднаго молока ничего не давать. Если въ комъ бѣлые комочки, пѣна и кислый запахъ, то дать кастороваго масла или отвара крушины; ¹⁾ если рветъ и проноситъ водой, то не давать груднаго молока, а только теплый чай съ краснымъ виномъ; если ноги и руки холодныя, то власть ребенка по шейку въ теплую воду на четверть часа; къ водѣ прибавить горчицы. ²⁾

Если мать кормить не можетъ своимъ молокомъ, то развести парное коровье молоко съ водой и вскипятить. Такое молоко держать на сѣту и брать не больше какъ на разъ. Давать подогрѣтое, теплое.

Признаки. 12. **Р О Ж А** Около какой нибудь трещинки или царапинки (часто не замѣтной) начинаетъ жечь и садить; кожа лоснится, краснѣетъ и припухаетъ. Краснота разливается въ стороны сплошнымъ пятномъ; иногда же около этого пятна показываются среди здоровой кожи

1) Объ этомъ смотри въ концѣ (приложеніе).

2) Объ этомъ смотри въ концѣ (приложеніе).

красные островки, которые вскорѣ сливаются въ одно красное припухшее поле; не рѣдко на этомъ полѣ приподнимаются волдыри какъ отъ ожога; иногда на немъ появляются темно-багровыя пятна, тутъ кожа мертвѣетъ, мѣсто гноится и медленно заживаетъ; остается морщинистый рубецъ. Если болѣзнь случится на лицѣ, то глаза совсѣмъ запухаютъ, носъ, уши и губы сильно вздуваются—больнаго узнать нельзя; вмѣсто лица дѣлается безобразная рожа. Вотъ по этому болѣзнь и называется рожей.

Часто болѣзнь начинается сильнымъ знобомъ. Во все время жаръ. Нemoжется, мучить жажда, во рту и подъ ложечкой (у сердца) не хорошо, сильная головная боль и бредъ особенно если рожа на головѣ. Краснота и опухоль не рѣдко ползетъ по тѣлу дальше и дальше, пока не обойдетъ кругомъ—тогда болѣзнь затягивается на нѣсколько недѣль.

Предосторожности отъ заразы. Зараза въ сукровицѣ и гною больнаго; заражается только тотъ, у кого есть на тѣлѣ какая нибудь ранка.

По этому нужно заботиться:

1. Чтобы зараза не накоплялась въ домѣ; для этого слѣдуетъ строго соблюдать 10, 11 и 15 правила.

2. Не допускать, чтобы зараза попадала въ рану; по этому всякая рана (даже ссадина или царапинка) должна быть закрыта. Если рана не велика, не загризена и ничѣмъ не тревожится (не берется), то скоро сама покрывается плотнымъ надежнымъ струпомъ (коростой) изъ запекшейся крови или сукровицы; подъ этимъ струпомъ, какъ подъ щитомъ, она въ безопасности и скоро заживаетъ. Но если рану расстрожили и загрязнили, то она долго мокнетъ, гноится

и не покрывается струпомъ. Въ этомъ случаѣ, безотлагательно слѣдуетъ обмыть рану теплой прокипяченной водой; воду лить струйкой изъ чистаго чайника; края обтереть чистой (ситю бѣлаго) вѣтошечкой; на посабдохъ рану присыпать борнымъ порошкомъ ⁽¹⁾, дать засохнуть и не тревожить больше. Каждый разъ какъ рана станетъ мокнуть, повторить съ ней то-же самое. Если рана сильно кровоточитъ, то **НЕ СЛѢДУЕТЪ** въ нее совать паутину, трутъ (что для огнива) и подобный хламъ, а по плотнѣ замать и держать такъ полчаса, часъ и больше—пока кровь не остановится, а потомъ сдѣлать такъ какъ выше сказано.

Уходъ. Если запоръ, дать проносное. ⁽²⁾ Давать кислое питье. Въ пищу кипяченое молоко, овсянку.

Намочить въ борной примочкѣ чистую ⁽³⁾ вѣтошку и гладко обернуть въ однорядъ большее мѣсто, а потомъ позивать по временамъ той-же примочкой, чтобы не высыхала. Волосы остричь, чтобы не мѣшали примачивать. Гдѣ лопнули пузыри, вмѣсто примочки дѣлать присыпку борнымъ порошкомъ ⁽⁴⁾—иначе рана загниетъ, а одежда присохнетъ и будетъ тревожить рану (беречь).

Скрытое начало. **13. СИФИЛИСЪ** (дурная боль, французская) обнаруживается **3—4** недѣли спустя послѣ зараженія.

Признаки. Начинается съ того мѣста, куда попала зараза. **Чаще всего** начинается съ дѣтородныхъ частей (на кожѣ и на головкѣ мужскаго члена, на мошонкѣ, на

⁽¹⁾ Объ немъ смотри въ концѣ (примечаніе).

⁽²⁾ Смотри въ концѣ (средства).

⁽³⁾ Смотри въ концѣ (средства).

⁽⁴⁾ Смотри тамъ-же.

губахъ передняго прохода женщины) отъ совокупленія съ распутными;—на губахъ отъ подблудень съ большими, отъ ложекъ, чашекъ, рюмокъ, папирсокъ (цигарокъ и трубокъ), которыми пользовался больной;—на соснахъ кормилицы, если ее сосалъ больной сифилисомъ ребенокъ.

На всѣхъ этихъ мѣстахъ кожа становится толще, твердѣетъ и не захватывается въ складку—на ошупъ кажется будто тутъ вмѣсто кожи хрящъ иногда величиною въ бобъ. Затвердѣлое мѣсто со временемъ немного краснѣетъ, лоснится и обращается въ язву; она углубляется и ширится, а подъ ней и вокругъ распространяется затверденье. Язва черезъ нѣсколько недѣль можетъ зажить, а затверденье остается долго. Иногда язвы не бывають, тогда больной можетъ не замѣтить начала этой страшной болѣзни. Проходитъ 6—7 недѣль отъ начала затверденья—и по всему тѣлу высыпаетъ изжелта красноватая сыпь, а въ перемѣжку съ ней прыщи, иногда-же и гнойнички. Къ этому времени подъ кожей въ пахахъ, подъ мышками, на шеѣ и у локтей можно прощупать кругловатые, твердые желвачки. Прыщи въ переднемъ и заднемъ проходахъ, на мошонкѣ на губахъ, подъ мышками и подъ титьками бывають плоски, широки, бѣловаты и мокнутъ. Сокъ съ этихъ прыщей очень заразителенъ. Пробывши нѣсколько недѣль или мѣсяцевъ, сыпь можетъ пройти, но потомъ не рѣдко появляется снова. Проходитъ иногда нѣсколько лѣтъ послѣ сыпи и больной считаетъ себя выздоровѣвшимъ, а болѣзнь снова дастъ о себѣ знать только совѣемъ ужъ иначе: появляется сильная ломота въ костяхъ особенно ночью. Кость припухаетъ и можетъ образоваться нарывъ, а послѣ него глубокая язва.

Таковыми изъями разбѣдаетъ кости; онѣ омертвѣваютъ, омертвѣлые кусочки выходятъ съ гноемъ. Отъ этого получаютъ разныя безобразія — проваливается носъ и проч. На кожѣ появляются кучки бугровъ, которые изъязвляются. Въ мозгу, въ легкихъ, въ печени и другихъ внутренностяхъ тоже бывають нарывы. Болѣзнь очень разнообразна и продолжительна — тинется иногда нѣсколько дѣсятковъ лѣтъ. Измученный и изуродованный больной преждевременно умираетъ. Дѣти рождаются ужъ зараженными этой болѣзью и невинно страдаютъ за своихъ родителей.

Предосторожности надеть на кожу гной изъ язвъ или сокъ изъ мокнущихъ прыщей. (1)

Заразяться можно только тогда, когда по-
Слѣдуетъ по этому избѣгать совокупленія
съ распухшими особенно въ шнцѣ видѣ-
пьяный неостороженъ, не брезгуетъ и больнымъ.

Послѣ всякаго подозрительнаго совокупленія
немедленно нужно обмыть дѣтородныя части
теплой водой съ мыломъ, чтобы не успѣла за-
раза подѣйствовать. (2)

Больнаго не слѣдуетъ цѣловать; чашка и
ложка у него должны быть особыя. Не слѣ-
дуетъ съ больнымъ курить одну и ту-же папиро-
ску (цыгарку или трубку; не слѣдуетъ утирать-
ся однимъ полотенцемъ (утиральникомъ). здо-
рван женщина не должна кормить грудью
(грудью) больнаго сифилитическаго ребенка.

Больнаго нужно немедленно отвратить въ
больницу или къ лѣкарю, чтобы скорѣе пере-
велась въ домъ зараза. Если болѣзнь не заста-
рѣла и не ухудшилась отъ неправильнаго лѣченія у
знахарей, то можно надѣяться, что знающій, на-
стойчивый лѣкарь (докторъ) ее уничтожить, только
нужно много времени и терпѣнья.

(1) Не бывало случаевъ, чтобы заражался чрезъ воздухъ, то есть — не-
дотрогнувшись до больнаго или его вещей.

(2) Да и вообще слѣдовало-бы завести обычай обмывать дѣтородныя
части каждое утро, какъ руки и лицо — меньше было-бы разныхъ болѣзней.

Ухода за больнымъ большей частью не требуется,
потому что онъ не лежитъ и даже можетъ работать.

Признаки. 14. ЧАХОТКА начинается простымъ кашлемъ;
со временемъ харкотина идетъ гноющая; потомъ къ ней
примѣшивается кровь жлѣчками или цѣлыми крова-
выми плевками. Въ концѣ болѣзни не рѣдко поносъ.
Кашель съ гноющей кровянистой мокротой отъ язвъ
въ легкихъ, а поносъ отъ язвъ въ кишкахъ.
Во все время болѣзни по вечерамъ знобитъ и видается
въ жаръ, а по ночамъ бываетъ проливной потъ.
Больной худѣетъ; ноги отекають и вскорѣ смерть.
Выздоровливають рѣдко.

Предосторожности Зараза въ харкотинѣ, по этому особенно
строгаго соблюдать 6, 7, 8, 9 и 10 правила.
отъ заразы.

Уходъ. Лѣтомъ какъ можно больше быть на вольномъ
воздухѣ, не выходить только когда холодно, сыро и
вѣтрено. Въ полдень сидѣть на самой припекѣ покрыв-
ши голову, а грудь и спину поочередно подстав-
лять солнцу, чтобы загорали. Пить понемножку, но
почаще кипяченое молоко. Какъ можно стараться,
чтобы въ домѣ не было вилли, вони и духоты.

15. СИБИРСКАЯ ЯЗВА (ныкидка) переходитъ изъ
человѣка отъ рогатаго скота и лошадей; человѣкъ отъ
человѣка заражается рѣдко. Болѣзнь обнаруживается
Скрытое спустя нѣсколько часовъ или дней (обыкновен-
начало. но не болѣе 7 дней) послѣ зараженія.

Признаки. На мѣстѣ, куда попала зараза (1) показывается
какъ отъ укуса мухи или овода и вскакиваетъ
твердый красный прыщичекъ. Вскорѣ на самой

(1) Чаще это случается на кожѣ непокрытой волосами

вершинѣ прыщичка дѣлается пузырекъ, нали-
вается темной сукровицей и лопается. Самъ
прыщикъ быстро растеть и превращается въ бугоръ,
середина, гдѣ былъ пузырекъ темнѣеть, мертвѣеть и
превращается въ язву; кругомъ далеко расходится
опухоль, а около самаго бугра высыпаются еще
нѣсколько пузырьковъ. Иногда прежде всего за-
пыхаютъ глаза, потомъ пухнетъ шея и все тѣло;
на кожѣ кромѣ омертвѣлаго бугра появляются пузы-
ри; сверхъ всего этого бываетъ поносъ одной тем-
ной кровью. Больной задыхается, синѣеть, слабѣеть
и умираеть.

Предосто- Зараза въ крови и сукровицѣ; она проникаеть
рожности даже сквозь неповрежденную кожу ('). По этому
отъзаразы. съ больными животными и людьми слѣдуетъ обра-
щаться какъ можно осторожнѣе и запачканныя
въ крови или сукровицѣ мѣста тотчасъ-же обмы-
вать теплой водой съ мыломъ; если же попало на
ранку или трещинку, то немедленно прижечь кале-
нымъ желѣзомъ и чѣмъ больше тѣмъ лучше; послѣ
этого 7 дней внимательно наблюдать, чтобы не
проглядѣть самаго начала болѣзни.

Больныхъ животныхъ отдѣлять, хлѣвы послѣ
нихъ выскабливать и обмывать горячимъ щелокомъ;
навозъ и землю изъ хлѣвовъ вывозить подалеже и
обжигать на кострѣ; запачканную вреднымъ сокомъ
одежду и другія вещи лучше сжигать, а если нельзя,
то распорядиться съ ними какъ сказано въ 10, 11,
13 и 14 правилахъ.

(') Черезъ лошадей зараза (такъ при сибирскѣ) не переходитъ.

Уходъ. Какъ только покажется прыщъ съ багровымъ пу-
зырькомъ на верхушкѣ, немедленно слѣдуетъ на-
чисто выжечь его раскаленнымъ до красна или до
бѣла желѣзомъ (') (гвоздемъ и тому под.).

Если больной задыхается, ослабъ и похудѣлъ, то
кромѣ выжиганья нужно чаще поить его крѣпкимъ
чаемъ съ виномъ или давать одно вино по рюмкѣ
разъ 6 въ сутки.

16. С А П Ъ бываетъ у лошадей; отъ нихъ чело-
Скрытое вѣкъ и можетъ заразиться. Обнаруживается 3—5
начало. дней спустя послѣ зараженія.

Начинается съ того мѣста, куда попала зараза;
тутъ дѣлается желвачекъ, который вскорѣ изъязвляется;
въ извѣ конится волочий кровянистый гной; подъ кожей
вдоль члена отъ извы тянутся какъ-бы узловатые шнур-
ки—это распухшія жилы; узелки обращаются то-же въ
язвы и такъ по всему тѣлу. Въ носу желвачковъ и язвъ
много, по этому течеть много волочихъ кровянистыхъ
соплей. Подъ конецъ во всемъ тѣлѣ не остается здороваго
мѣста—вездѣ нарывы. При всемъ томъ больного то
сильно знобитъ, то кидаетъ въ жаръ. Болѣзнь можетъ
затянуться на нѣсколько мѣсяцевъ, но всезани приведетъ
къ смерти.

Предосто- Зараза въ сопляхъ, въ крови и другихъ сокахъ.
рожности По этому строго соблюдать 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 и 17
отъзаразы. правила. Мѣста, на которыя попала зараза, тотчасъ-же
обмыть, а гдѣ ранки прижечь каленымъ желѣзомъ; 5 дней
особенно старательно наблюдать эти мѣста, чтобы при

(') Разумѣется если бытность случай заразиться.

первыхъ признакахъ повторить прижиганье. Съ больными животными, хлѣвами и другими вещами поступать такъ-же какъ при сибирской язвѣ.

Уходъ. Послѣ выжиганья казеннымъ желѣзомъ остается только слѣдить за ходомъ болѣзни; если рана мокнетъ — присыпать ее по временамъ борнымъ порошкомъ промывши прежде чистой кипяченой водой. Если выжиганіе во время не сдѣлано и парывы пошли по всему тѣлу, то больного можно считать почти погибшимъ; тутъ остается только виномъ и хорошей пищей поддерживать силы.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ. Кромѣ всего сказаннаго о заразныхъ болѣзняхъ нужно замѣтить, что не все люди одинаково поддаются заразѣ. Работящій, опрятный и осторожный, но не трусливый рѣже поддается. Чаще заражаются пьяницы, обжоры, перихи, лѣнтяи и трусы, а такъ-же изнуренные непосильной работой, живущіе въ холодѣ и голодѣ.

Теперь прошу помнить:

1. Чистый воздухъ, чистая вода, огонь да дѣльныя руки—вотъ самыя вѣрныя средства ото всякой заразы. Слава Богу, ихъ не покупать. Остается только какъ можно больше ими пользоваться.

2. Безъ этого не помогутъ покупаемыя средства, о которыхъ сейчасъ будетъ рѣчь;—не помогутъ ни знаменитые доктора, ни самыя дорогія аптечныя вещи!

П Р И Л О Ж Е Н І Е.

Средства для ухода за больными и для уничтоженія паразитов.

Всякій можетъ и долженъ имѣть запасъ этихъ средствъ; онѣ въ началѣ болѣзни такъ-же полезны, какъ ведро воды въ началѣ пожара.

I. П р о н о с н ы я.

1. Кора крушины. Крушина растетъ въ лѣсу. Кору сдираютъ лѣтомъ, мелко рѣжутъ и сушатъ на солнцѣ; хранить въ сухомъ мѣстѣ.

Отваръ коры проноситъ безъ боли и не противенъ. Давать его можно при всѣхъ вышеописанныхъ болѣзняхъ, когда животъ (брюхо) тугой и не было до вѣтру нѣсколько дней.

Приготовленіе отвара: чайная чашка сушеной коры и 3 чашки воды вскипятить и процѣдить.

Разовой приѣмъ: ребенку до году 1 хлѣбальную ложку; ребенку до 10 лѣтъ 1 рюмку; взрослому 1 чайную чашку. Если не подѣйствуетъ, то черезъ 2 часа можно повторять.

2. Касторовое масло можно купить въ лавкахъ и аптекахъ. Дѣйствуетъ вѣрнѣе, но противно; лучше пить разогрѣтое. Давать преимущественно въ началѣ кроваваго поноса, пока есть еще кака въ испражненіяхъ; хорошо такъ-же при брюшномъ тифѣ и рожѣ.

Разовой приѣмъ: ребенку до году 1 чайную ложку, ребенку до 10 лѣтъ 2 чайныя ложки, взрослому хлѣбальную ложку.

II. Средства для подкрѣпленія силъ употребить тогда, когда ноги и руки холодныя, а самого разжигаетъ или проноситъ.

1. Церковное красное вино. Кислое употребить не слѣдуетъ.

Давать больному подогрѣтое или съ теплымъ чаемъ: ребенку до году 1 чайную ложку, ребенку до 10 лѣтъ 1 хлебальную ложку, взрослому рюмку. Пріемы черезъ два часа повторять пока не согрѣются руки и ноги.

2. Хорошій чай заварить двѣ чайныя ложки въ небольшомъ чайникѣ, но на канфорку не ставить. Давать съ краснымъ виномъ или одинъ черезъ два же часа.

3. Горчица полезна для дѣтей при лѣтнемъ поносе, когда руки и ноги холодныя. Двѣ горсти на ведро теплой воды. Въ такую воду класть дѣтей по шейку на четверть часа и потомъ тепло укутывать.

III Средства, которыя не позволяютъ заразе съ больнаго и вещей разлетаться по воздуху.

Онѣ не крошатся, лишки и потому привлекаютъ заразу къ мѣсту

1. Мыло разведенное въ водѣ. Взять хорошаго мягкаго желтаго мыла $\frac{1}{2}$ фунта на 3 ведра кипяченой воды.

Употребленіе: при оспѣ и горичкахъ обтирать тѣло самой холодной мыльной водой; если же холодѣютъ руки и ноги, то ниже коленъ и локтей — теплой мыльной водой и завертывать потаще, а туловище не кутать. При скарлатинѣ и кори обтирать теплой мыльной водой.

Для намачиванья замаранныхъ штановъ, рубахъ, полотенецъ и проч. тряпья, а такъ же для пятенъ отъ плевковъ, рвотинъ (блевотинъ), харкотинъ, испражнений, мочи и проч. лучше мыльный кипятокъ.

3. Деготь, смола, вареное льняное масло пригодны для замаранныхъ половъ, локаней, черепей и прочей посуды. Смазывать лучше горячимъ.

IV. Средства которыя уничтожаютъ въ ранѣ гниль.

1. Борный порошокъ состоитъ изъ борной кислоты и толченыхъ квасцовъ.

Растертой борной кислоты и квасцовъ можно кунить въ аптекѣ.

Чтобы составить этотъ порошокъ нужно взять 6 ложекъ борной кислоты и 1 ложку квасцовъ и хорошенько перемѣшать.

Употреблять для присыпки ранъ, язвъ и обожженныхъ мѣстъ промывши ихъ сначала кипяченой теплой водой; чѣмъ больше рана мокнетъ, тѣмъ чаще ее присыпать. Порошокъ стряхивать съ чистою пушистаго перышка.

2. Борная примочка готовится изъ борнаго порошка: чайную ложку или большую щепотъ на чайную чашку кипятку развести и охладить. Она уменьшаетъ воспаленіе кожи и не даетъ гнить. При ожогахъ лица и при оспѣ намачивать чистой ветошкой и покрывать все лицо; нужно, чтобы тряпка лежала гладко и въ однорядъ; почаще поливать, чтобы не высыхала.

3. Борное полосканье употребляютъ при скарлатинѣ и дифтеритѣ. Чтобы его составить, нужно взять чай-

ную ложку борнаго порошка и развести въ стаканѣ
кипятку. Полоскать во рту и горлѣ теплымъ; НЕ
ГЛОТАТЬ - по этому малымъ дѣтямъ не давать.


4. Скипидаръ очищенный уменьшаетъ гниль и
заразу. Капнуть 10 капель въ кипятокъ и дышать
надъ паромъ широко раскрывши ротъ. Полезно при
скарлатинѣ и дифтеритѣ.

- | | | |
|-------------------|---|---------------|
| Запасъ и
цѣна. | 1. Кастороваго масла $\frac{1}{2}$ фун. 25 к. (изъ аптеки). | } ИЗЪ АПТЕКИ. |
| | 2. Хорошаго церковнаго вина 1 бут. 50 коп. Де-
шеваго, кислаго брать не слѣдуетъ—вредно. | |
| | 3. Хорошаго чаю $\frac{1}{2}$ ф. 40 к. Дешевый вреденъ. | |
| | 4. Горчицы 2 сорта 1 ф.—30 л. | |
| | 5. Мыла простаго мягкаго желатаго 2 ф. - 18 к. | |
| | 6. Борной кислоты мелко растертой 1 ф.—60 к. | |
| | 7. Мелко истолченныхъ квасцовъ 1 ф.—40 к. | |
| | 8. Скипидару очищеннаго 1 ф.—30 к. | |

Всего на 2 р. 93 к.

Средства эти не портятся, если только закупорены
и хорошо завернуты. По этому могутъ лежать не
одинъ годъ.

Остальное все есть дома.



Замѣченныя опечатки.

Стр- ницы.	Строки.	Напечатано.	Нужно.
8	3 свер.	перемешку	перемешку
8	14 свер.	саѣзахъ	слезахъ
8	3 низ.	захлебнулся	захлебнулся
8	7 низ.	приступья	приступы

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

